

# Bekämpfungsrichtwerte Rapsschädlinge

Schaderreger	Termin/Stadium	Bekämpfungsrichtwert
Rapserdfloh	01.09. bis 20.09.	> 75 Käfer/GS
	20.09. bis 31.10.	> 50 Käfer/GS in 10 Tagen
	BBCH 00 - 14	im Bestand: > 10 % Lochfraß
Rübsenblattwespe	Herbst	1 Larve/Pflanze
Erdraupen	Herbst	4 Larven/m <sup>2</sup>
Großer Rapsstängelrüssler	Ende Februar/Anfang März Knospenbildung	> 5 Käfer/GS in 3 Tagen mit Abdeckung im Bestand: 3 Käfer/Linie
Gefleckter Kohltriebrüssler	Mitte/Ende März Knospenbildung	> 15 Käfer/GS in 3 Tagen mit Abdeckung im Bestand: > 20 Käfer/Linie
Rapsglanzkäfer	BBCH < 55	> 5 Käfer/Haupttrieb
	BBCH 55 - 59	> 8 Käfer/Haupttrieb
Kohlschotenrüssler	ab Ende April kurz vor der Rapsblüte	25 Käfer/Linie bzw. 12 Käfer/Linie, wenn starkes Auftreten der Kohlschotenmücke erwartet wird

GS = Gelbschale

Quelle: Pflanzenschutz in Ackerbau und Grünland 2014; eine Information der Pflanzenschutzdienste der Länder Berlin, Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen

