

## LSV Winterraps - Vorinformation

Landesforschungsanstalt  
für Landwirtschaft und Fischerei

### relativer Ertrag im Mittel zweier Intensitätsstufen

**Korrektur: Die Ertragswerte am Standort Gülzow wurden korrigiert!**

Aufgrund sehr feuchter Bodenverhältnisse zur Aussaat und der Witterungsbedingungen des aktuellen Jahres zeigten die Bestände in den Versuchen oft ein eher unruhiges Bild. Das zeigt sich nun auch in der Präzision (Grenzdifferenzen) der einzelnen Versuche. **Die LSV in Gülzow, Groß Kiesow und Biestow sind nur bedingt wertbar.** Bitte bei der Bewertung der Ergebnisse an den Einzelorten beachten.

Stand: 07.08.2018	2018								2012-2017	
	D-Nord							zu	D-Nord	MV-Süd
	Bie- stow 1	Tütz- patz 1	Tütz- patz SpS	Groß Kiesow 1	Gül- zow	Veel- böken 3	Dede- low 1	Vippe- row		
Landkreis	HRO	DM	DM	VG	LRO	NWM	UM	MÜR		
Ackerzahl	45	48	48	39	48	56	42	30		
langj.N (mm)	653	527	527	537	559	650	500	609		
Datum Aussaat	1.9.	28.8.	4.9.	29.8.	23.8.	28.8.				
Avatar	H	98	100	102	99	96		97	93	97
Bonanza	H		95		97	102				99
Fencer	H	104	106	100		95			102	98
Penn	H	94	102	103	94	96		93	103	98
Raffiness	H	95	96		101	91		90	91	99
Alvaro KWS	H	96	101	103	108	98		108	104	97
Arazzo	H							98	106	96
Archipel	H		99		94	92		98	96	95
Bender	H	93	98		94	106		100	99	99
Asterion	H	124	110	106	101	114		107	103	101
DK Exalte	H	106	104			83		104	98	99
DK Exception	H	116	110		103	101		109	102	102
DK Exentiel	H		105		99	87				100
Hatrick	H	102	94		101	97		106	100	103
INV 1055	H	89			98	78			99	97
Leopard	H	90	95		99	95		97	96	100
Muzzical	H	96	101		86	98		102	100	101
PT 225	H	93	99		96	90		91	94	95
Tonka	H	80	98		96	79		90	95	96
Trezzor	H	99	100	104	103	102		100	107	104
Architect	H	129	115	111	109	121		113	109	[ 103 ]
DK Expansion	H	99	113		113	108		105	105	[ 101 ]
Puzzle	H	86	96	100	102	102		106	105	[ 110 ]
PT 256	H	117	106		97	101		102	104	[ 98 ]
Anhang Sorten mit rassenspezifischer Kohlhernieresistenz										
Mentor	H				99					94
Menhir	H		91	92	91	76				94
PT 242	H				90					92
100%=dt/ha		31.5	39.4	<sup>2</sup> 56.7	37.9	30.8	[35.7] <sup>3</sup>	40.7	47.8	50.8
Grenzdifferenz rel. (%)		14.0	10.3	7.1	16.5	13.1		7.4	4.1	
Grenzdifferenz abs. (dt/ha)		4.4	4.1	4.1	6.3	4.0		3.0	2.0	

Sorten der Bezugsbasis (=100%): Avatar, Penn, Raffiness, Alvaro KWS, Bender, Asterion, Hatrick, Trezzor  
SpS - Spätsaat [ ] - geringere Datenbasis

<sup>1</sup> - nur Intensitätsstufe II (ortsüblich)

<sup>2</sup> - Bezugsbasis angepasst (über orthogonalem Kern zum LSV am gleichen Standort)

<sup>3</sup> - nicht wertbar, es wird nur das Versuchsniveau ausgewiesen